

IBE and ILAE Joint Statement

SARS Covid-19 Impfung und Patientinnen mit Epilepsie

Die bisher erhältlichen Impfungen gegen SARS Covid-19 bestehen aus 2 Injektionen, die in Abstand von 3 oder 4 Wochen verabreicht werden.

Diese Impfungen verhindern mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% eine SARS Covid-19-Erkrankung. Es gibt keine wissenschaftlichen Daten die darauf hinweisen, dass Epilepsie einen Risikofaktor für unerwünschte Wirkungen durch die SARS Covid-19-Impfung darstellt. Die allermeisten Experten stimmen darin überein, dass die Vorteile einer Impfung gegen SARS Covid-19 für Menschen mit Epilepsie, deutlich die Risiken für unerwünschte Wirkungen überwiegen.

Wie bei jeder anderen Impfung kann jedoch nach der Immunisierung Fieber entstehen. Fieber kann bei manchen Patienten dazu führen, dass es leichter zu epileptischen Anfällen kommt.

Bevor Sie eine Impfung gegen SARS Covid-19 erhalten, sollte die Ärztin oder der Arzt der Sie impft, darüber informiert werden, dass Sie an Epilepsie leiden.

Außerdem sollten Sie folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Haben Sie Allergien, insbesondere auf Inhaltsstoffe der SARS Covid-19-Impfung
- Haben Sie Allergien auf frühere Impfungen entwickelt
- Haben Sie derzeit Fieber oder eine andere Infektion
- Welche Medikamente nehmen Sie ein
- Nehmen Sie Medikamente ein, die das Immunsystem supprimieren (z.B. Immunsuppressiva oder immunmodulierende Therapien)
- Sind Sie schwanger, stillen Sie oder wollen Sie schwanger werden

Wie bei allen anderen Impfungen, sollten Sie die Impfung gegen SARS Covid-19 nicht erhalten, wenn Sie gegen Inhaltsstoffe dieses Impfstoffes allergisch sind.

Sie sollten die zweite Dosis nicht erhalten, wenn Sie nach der ersten Dosis eine allergische Reaktion entwickeln sollten.

Im Gegensatz zu einigen anderen Impfungen beinhalten die SARS Covid-19-Impfstoffe der Firma Biontech/Pfizer und Moderna kein Hühnereiweiß, sodass eine Hühnereiweißallergie keine Kontraindikation für diese Impfung darstellt.

Auch wenn Sie schon eine SARS Covid-19-Impfung erhalten haben, ist es wichtig, dass Sie weiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandregeln einhalten. Mit den derzeit verfügbaren Impfstoffen reduziert sich zwar Ihr Risiko an SARS Covid-19 zu erkranken um 90%, allerdings können auch geimpfte Menschen weiterhin infektiös sein und andere Menschen mit SARS Covid-19 anstecken, ohne es selbst zu wissen und ohne selbst Symptome zu haben.

IBE-epilepsy.org

ILAE.org

 **COVID-19**