

IBE and ILAE Joint Statement I vaccini COVID-19 e le persone con epilessia

I vaccini contro il COVID19 sono in fase di approvazione e stanno diventando disponibili alla popolazione.

Non ci sono al momento evidenze che le persone con epilessia abbiano un più alto rischio di effetti indesiderati dopo la vaccinazione contro il COVID-19. Per le persone con epilessia, il rischio di infezione da COVID-19 e di potenziali complicanze supera di gran lunga il rischio di effetti collaterali da vaccino contro il COVID-19. Come per altri vaccini, tuttavia, dopo la vaccinazione potrebbe manifestarsi febbre, che potrebbe abbassare la soglia delle crisi in alcune persone. Gli antipiretici (ad esempio, paracetamolo/tachipirina) presi regolarmente per 48 ore dopo la vaccinazione (o per la durata della febbre) riducono al minimo questo rischio.

Prima di ricevere un vaccino COVID-19, assicurati di far sapere al personale sanitario che somministra il vaccino che hai l'epilessia, così come qualsiasi altra importante informazione medica, come ad esempio:

- Allergie, in particolare un'allergia a qualsiasi ingrediente del vaccino
- Reazioni allergiche a vaccini precedenti (ad esempio vaccino antinfluenzale)
- Febbre o infezione attuale o recente
- Tutti i farmaci che stai assumendo, in particolare i farmaci che sopprimono il sistema immunitario (ad esempio farmaci immunomodulatori o immunosoppressivi) o anticoagulanti.
- Stato di gravidanza o allattamento, o se si programma una gravidanza

Come con qualsiasi vaccino, non dovresti ricevere il vaccino COVID-19 se sei allergico a qualcuno dei suoi ingredienti. Non devi ricevere la seconda dose se hai avuto una reazione allergica alla prima dose.

Se hai già ricevuto il vaccino COVID-19, è importante continuare a indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale. Gli attuali vaccini riducono il rischio di ammalarsi di COVID-19 fino al 90%, a seconda del vaccino, ma le persone vaccinate potrebbero ancora essere in grado di diffondere l'infezione COVID-19 ad altri senza sapere di essere portatori.

IBE-epilepsy.org

ILAE.org



COVID-19