

اطلاعیه IBE و ILAE

در مورد واکسن کووید ۱۹ و افراد مبتلا به صرع

واکسن های کووید ۱۹ هم اکنون تأیید شده و در دسترس هستند.

در حال حاضر هیچ شواهدی مبنی بر این که داشتن صرع، می تواند خطر عوارض جانبی واکسن کووید ۱۹ را بیشتر کند، به دست نیامده است. برای افراد مبتلا به صرع، خطر عفونت کووید ۱۹ و عوارض بالقوه آن، خیلی بیشتر از خطر عوارض جانبی واکسن کووید ۱۹ است.

به هر حال بعد از تزریق واکسن کووید ۱۹، مثل سایر واکسن ها احتمالاً تب ایجاد می شود. این تب، می تواند در بعضی افراد، آستانه تشنج را پایین بیاورد. لازم است در ۴۸ ساعت اول بعد از واکسیناسیون، داروهای تب بر (مانند استامینوفن) به صورت مرتب (در زمان تب) مصرف شوند؛ تا این خطر کاهش یابد.

پیش از این که واکسن کووید ۱۹ را دریافت کنید، مطمئن شوید که فرد مسئول واکسیناسیون، از صرع شما و سایر اطلاعات مهم پزشکی شما اطلاع دارد؛ مانند موارد زیر:

- حساسیت ها؛ هر حساسیتی که به هر دارویی دارید یا به ویژه به اجزاء این واکسن.
- هر واکنش آلرژیکی که پیش از این به واکسن های قبلی داشته اید.
- اگر عفونت یا تب دارید یا قبلاً داشتید.

• داروهای مصرفی؛ به ویژه داروهایی که سیستم ایمنی را ضعیف می کنند (مانند داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی) یا داروهای ضد انعقاد خون.

• اگر باردار هستید یا شیردهی دارید؛ یا برنامه ای برای بارداری دارید.

مثل هر واکسن دیگری، اگر به اجزاء این واکسن، حساسیت دارید، نباید آن را دریافت کنید. همچنین اگر در نوبت اول واکسیناسیون، دچار واکنش آلرژیک شدید، نوبت دوم نباید تزریق شود.

بعد از دریافت واکسن کووید ۱۹، مهم است که باز هم ماسک زده و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. واکسن های جدید (بسته به نوع واکسن) تا ۹۰ درصد، احتمال خطر بروز بیماری کرونا را در شما کاهش می دهند؛ اما افراد واکسینه شده، هنوز می توانند ناقل ویروس کووید ۱۹ به دیگران باشند، بدون این که خودشان بدانند.

